

Aspetto dei genitali femminili: alla scoperta della “normalità”

Jillian Lloyd, Naomi S. Crouch, Catherine L. Minto, Lih-Mei Lian, Sarah M. Creighton
BJOG: an International Journal of Obstetrics and Gynaecology, May 2005., Vol 112, pp 643-646

Obiettivo: Descrivere le variazioni nelle dimensioni dei genitali in donne normali

Progetto: studio basato sull'osservazione a campione

Luogo: Elizabeth Garrett Anderson Hospital, University College Hospital NHS Trust, London, UK

Popolazione: 50 donne, prima della menopausa, sottoposte in anestesia generale a procedure ginecologiche che non coinvolgevano i genitali esterni

Metodi: Studio a campione, usando fotografia digitale e misurazioni dei genitali esterni

Principali obiettivi delle misurazioni: dimensioni del clitoride, lunghezza e larghezza delle labbra, colore e rugosità, lunghezza della vagina, distanza dal clitoride all'orificio uretrale, distanza dalla forchetta posteriore al margine anale anteriore

Risultati: è stata notata un'ampia gamma di valori per ogni misurazione. Non sono state trovate associazioni statisticamente significative con l'età, il numero di parti, l'etnia, l'uso di ormoni o la storia di attività sessuale.

Conclusioni: Le donne hanno un'ampia variabilità nelle dimensioni dei genitali. Questa informazione dovrebbe essere resa disponibile alle donne nel momento in cui debbano decidere sull'uso di procedure chirurgiche sui genitali, decisioni che devono essere attentamente considerate dal chirurgo e dalla donna